



I'm not robot



**I am not robot!**

Dor escrotal e edema ocorrem geralmente unilateralmente. Les épididymites à *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae* compliquent une uréthrite non traitée, symptomatique ou non symptomatique. Le traitement recommandé contre l'épididymite probablement causée par un agent pathogène transmissible sexuellement consiste maintenant en l'administration d'antibiotiques. L'épididymite et l'orchépididymite sont diagnostiquées par un examen clinique, une analyse d'urine et parfois une échographie Doppler. Acute orchépididymitis is a frequent reason for consultation in the emergency department. Une bourse aiguë correspond à une douleur du testicule et ou de ses annexes accompagnée de signes locaux ou généraux. Recommandations pour la prise en charge des infections génitales de l'homme: uréthrite et orchépididymite. PCR, ECBU, antibiothérapie ceftriaxone et doxycycline. Les épididymites à *C. trachomatis* et *N. gonorrhoeae* compliquent une uréthrite non traitée, symptomatique ou non symptomatique. doxycycline 100 mg x 2/jour per os pendant 7 jours ou ofloxacin 400 mg x 3/jour per os pendant 7 jours. L'épididymite est caractérisée par un gonflement, une rougeur, un œdème et une hyperthermie de la peau du scrotum, ainsi que par des douleurs locales. *E. coli*, etc) sont plus fréquentes (infection urinaire, instrumentation endo-urétrale). Recommandations thérapeutiques: Epididymite du sujet jeune (