

Le sang, les abats et la bouse de vache sont mélangés dans un grand pot ouvert. Les mouches vont pondre dans ce mélange et les asticots vont s'y nourrir L'une des stratégies permettant de réduire le coût alimentaire de son élevage est le choix d'un mode approprié d'alimentation. La recherche a montré que la courbe de croissance varie suivant les sujets Le pot est rempli avec 1/3 d'eau. Meilleure protection contre les prédateurs. Avant le recensement, les services d'élevages considéraient que le poulet constituait% des volailles élevées au Niger (RGAC.). Moins de risques d' infection que dans un poulailler fermé • Gestion appropriée de l'élevage selon les besoins évolutifs des oiseaux. Si dans un troupeau de reproducteurs, les cogs ne représentent que à 9% du cheptel, ils sont responsables de% de la qualité des CENTRE E ODUCTION RECHERCrwrr POULEr DE CHAIR DE Er. Is pue. Découvrez les bonnes pratiques Created Date/12/ AM La production du poulet de chair est composée de plusieurs étapes de développement: Le couvoir se charge de la manipulation de l'œuf à couver et de l'éclosion ; la ferme de l'engraissement se charge de la croissance, la salle de finition s'occupe de poulets finis et de leurs carcasses On sélectionne les coquelets à l'âge de huit ou neuf semaines. Created Date/10/ PM La dénomination «volailles de ferme» concerne l'élevage à la ferme des espèces suivantes: poulets, pintades, canards à rôtir, dindes, oies à rôtir, chapons, cailles, Cet objectif propre à chaque éleveur peut dans certains cas être élargi à plusieurs éleveurs susceptibles de commercialiser ensemble leur production pour approvisionner par pondeuses, 1,2%. Le contrôle est plus facile que dans un élevage en liberté. Cela présente deux avantages importants) C'est l'âge idéal pour sélectionner les sujets les plus vigoureux) Les mâles les moins bons pourront être sacrifiés comme poulets à rôtir. L'apport de Objectif. Le présent travail évalue l'application des mesures de prophylaxie sanitaire dans les élevages de. Il n'existe pas deux bâtiments d'élevage identiques ; chaque lot de poulets de chair requiert un type de L'ELEVAGE DES COQUELETS. poulets de chairs, souche COBB, dans le département de • En somme, cette étude a dém ontré qu'en élevage de coquelets, l'efficience alimentaire n'est pas significativement différente entre les deux stratégies alimentaires testées La présente étude vise à déterminer sur la base de performances bioéconomiques, entre la pratique de la ration complète et le système cafétéria d'alimentation, la stratégie alimentaire la plus indiquée pour l'élevage des coquelets dans les conditions tropicales du Bénin Ces enquêtes ont porté sur les caractéristiques des élevages (état socio-économique de l'éleveur, mode d'élevage, reproduction et destination des produits d'élevage) et sur la description phénotypique de poules locales Elevage d'asticots Les asticots peuvent être élevés par une simple technique et utilisés comme complément de nourriture au régime des petits poussins.