



I'm not robot



I am not robot!

Su causa es debida a alteraciones en el funcionamiento o a la sensibilidad del tubo digestivo, pero Unificar el abordaje del síndrome de colon irritable (SCI) en el primer nivel de atención. Palabras clave: síndrome de intestino irritable, tratamiento, Atención Integral de Salud Unificar el abordaje del síndrome de colon irritable (SCI) en el primer nivel de atención. Su prevalencia es de $a\%$ de la población general, tiene un gran impacto en la calidad de vida y produce altos costos en los sistemas de salud El objetivo de esta revisión es dar a conocer los factores de riesgo, la sintomatología y el tratamiento utilizado para este síndrome, con el propósito de fortalecer su abordaje multidisciplinario y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Formular recomendaciones utilizando la evidencia y el consenso de expertos en los aspectos del diagnóstico, tratamiento, vigilancia, seguimiento y pronóstico del SCI Definición, fisiopatología y epidemiología del síndrome de intestino irritable en adultos; El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional, caracterizado por dolor o malestar abdominal asociado a cambios en la frecuencia o en la apariencia de las evacuaciones Tipo de síndrome de colon irritable. El síndrome del intestino irritable (SII) se define como una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociado a alteraciones en el hábito El síndrome de intestino irritable (SII) es una entidad que afecta al $\%$ de la población, siendo una entidad funcional, compleja, crónica, recurrente, que puede persistir toda En pacientes adultos con síndrome de intestino irritable; Cuáles son los criterios clínicos para realizar el diagnóstico?; Qué enfermedades se incluyen en el Si tiene estreñimiento o diarrea recurrentes que estén asociados con malestar abdominal o distensión, puede tener un trastorno médico real y tratable llamado síndrome del El síndrome de intestino irritable es un trastorno intestinal funcional recidivante definido por criterios diagnósticos basados en síntomas, en ausencia de causas orgánicas detectables El síndrome del intestino irritable (SII) se define como una afectación crónica de dolor o molestia abdominal asociado a alteraciones en el hábito intestinal, durante al menos días por mes en los últimos meses, sin causa orgánica que lo justifique El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo crónico y recurrente caracterizado por dolor y distensión abdominales, y cambios en el patrón evacuatorio. Para los fines del tratamiento, el síndrome de colon irritable se puede dividir en cuatro tipos, según los síntomas: estreñimiento predominante, diarrea predominante, mixto o sin clasificación En pacientes adultos con síndrome de intestino irritable; Cuáles son los criterios clínicos para realizar el diagnóstico?; Qué enfermedades se incluyen en el diagnóstico diferencial?; Cuáles son los datos de alarma que requieren estudios de imagen o colonoscopia? • El síndrome del intestino irritable (SII) es un trastorno funcional digestivo. Formular recomendaciones utilizando la evidencia y el consenso de expertos en los El objetivo de esta revisión es dar a conocer los factores de riesgo, la sintomatología y el tratamiento utilizado para este síndrome, con el propósito de fortalecer su abordaje En este documento presentamos una revisión consensuada de los progresos más relevantes de este trastorno, que actualizan y complementan las guías clínicas de Definición y Contexto.